

**Predčasne narodení  
novorodenci  
< 32. gestačným  
týždňom**

Uložte neosušených  
do fólie zabalte + použite  
sálavý ohrievač

Inspirovaný kyslík  
(≥ 32 gestačný týždeň 21 %)  
28-31 gestačný týždeň 21-30 %  
<28 gestačný týždeň 30 %

Začnite s tlakom 25 cm H<sub>2</sub>O

Akceptovateľné  
preduktálne SpO<sub>2</sub>  
V 2. minúte 65%  
V 5. minúte 85%  
V 10. minúte 90%

TITRUIŠTE KYSLÍK NA DOSIAHNUTIE CIELOVEJ SATURÁCIE

**(Prenatálne poradenstvo)**  
Inštruktáž tímu & kontrola pomôcok

**Pôrod**

Ak je to možné odložte podviazanie  
pupočníka

Zapnite časovač alebo zaznamenajte čas  
**Osušte/zabalte, stimulujte,  
udržujte v teple**

**Zhodnotte tonus, dýchanie,  
frekvenciu srdca**

Pri nedostatočnom dýchaní:  
**Spriechodnite dýchacie cesty**  
U predčasne narodených - zväžte CPAP

**Ak nedýhajú alebo sú prítomné  
lapavé dychy:**  
**5 vdychov (30 cm H<sub>2</sub>O)**  
Monitorujte SpO<sub>2</sub> +/-EKG

**Prehodnotte**  
Ak bez vzostupu srdcovej frekvencie,  
hľadajte pohyb hrudníka

**Ak sa hrudník nedvíha**  
Skontrolujte masku, polohu hlavy a sánky  
Podpora 2 osobami  
(Odsatie/Laryngeálna maska/Tracheálna kanyla)  
Zväžte navýšenie inspiračného tlaku  
**Opakujte 5 vdychov**

**Prehodnotte**  
Ak bez vzostupu srdcovej frekvencie,  
hľadajte pohyb hrudníka

Keď sa hrudník dvíha  
pokračujte vo ventilácii

**Ak je frekvencia srdca neprítomná/veľmi nízka  
(<60 za minútu) po 30 sekundách ventilácie**  
Koordinujte 3 kompresie hrudníka a 1 vdych  
Zvýšte kyslík na 100%  
Zväžte intubáciu ak sa tak ešte nestalo  
(alebo laryngeálnu masku ak intubácia nie je možná)

**Prehodnotte**  
Skontrolujte frekvenciu srdca  
každých 30 sekúnd

**Ak je frekvencia srdca neprítomná/veľmi nízka:**  
**Cievny prístup a lieky**  
Zväžte iné faktory napr.: pneumotorax, hypovolémia,  
vrodené abnormality

Informujte rodičov a tím  
Dokončite dokumentáciu

Približne 60 sekúnd

UDRŽUJTE TEPLOTU

PO CELÚ DOBU - POTREBUJETE POMOC?