

PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ


OKAMŽITÁ LIEČBA

- Dýchacie cesty a dýchanie
- Udržujte SpO₂ 94–98 %
 - Zabezpečte priechodnosť dýchacích ciest pokročilou pomôckou
 - Kapnografická krivka
 - Ventilujte pľúca do normokapnie

- Krvný obeh
- 12-zvodové EKG
 - Zaisťte spoľahlivý intravenózný prístup
 - Cieľ systolického TK je > 100 mmHg
 - Tekutiny (kryštaloidy) – obnovte normovolémiu
 - Invazívne monitorovanie arteriálneho krvného tlaku
 - Zvážte vazopresory/inotropiká aby ste udržali systolický TK

- Kontrola telesnej teploty
- Konštantná teplota 32 °C – 36 °C
 - Sedácia; kontrola triašky

DIAGNOSTIKA



OPTIMALIZÁCIA ZOTAVENIA

- Manažment intenzívnej starostlivosti
- Kontrola telesnej teploty: konštantná teplota 32 °C – 36 °C po dobu ≥ 24 hodín; zabrániť horúčke po dobu najmenej 72 hodín
 - Udržujte normoxiu a normokapniu; protektívna ventilácia
 - Zabráňte hypotenzii
 - Echokardiografia
 - Udržujte normoglykémiu
 - Diagnostikujte/liečte kŕče (EEG, sedácia, antiepileptiká)
 - Odložte prognostikáciu najmenej o 72 hodín

Sekundárna prevencia napr. ICD, skrining dedičných porúch, manažment rizikových faktorov

Funkčné zhodnotenie pred prepustením z nemocnice

Štruktúrované sledovanie po prepustení z nemocnice

Rehabilitácia